

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГРАНДАКСИНА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Я.М. Вахрушев, Е.В. Белова, Л.И. Ефремова
Ижевская государственная академия

Опубликовано в журнале *Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология*
№4 2004

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:

В исследовании приняли участие 40 пациентов: Основная группа - 29 с эрозивным гастродуоденитом и 11 с сочетанием язвенной болезни и эрозивного поражения гастродуоденальной области. Группа сравнения – 11 пациентов.

Грандаксин назначался по 1 таблетке 2 раза в день в течение 10 дней в составе комплексной терапии (антибактериальные и антисекреторные препараты, антациды, иммуномодуляторы)

- Шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина
- Оценивалось содержание свободных и олигосвязанных сиаловых кислот (оценка протективных свойств желудочной слизи)
- Уровень белковосвязанных сиаловых кислот (оценка регенеративной способности слизистого геля).
- рН-метрия.
- Эндоскопия желудка и двенадцатиперстной кишки.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

- Болевой синдром и диспепсические расстройства в основной группе были купированы у 96% больных (88% в группе сравнения).
- Боли, в группе больных получавших Грандаксин, исчезли за 7.56 дня, в группе сравнения за 10.1 дня.
- Болезненность при пальпации эпигастральной и пилородуоденальной области была устранена в основной группе у 77% больных через 8 дней, а в группе сравнения у 67% пациентов через 12 дней.
- В группе больных получавших Грандаксин достоверно улучшились показатели функционального состояния желудочного сока и протективные свойства желудочной слизи.
- Эндоскопическая ремиссия была отмечена у 100% больных основной группы через 16 дней и у 96% больных группы сравнения на 18 день.

ВЫВОДЫ:

- Курсовое использование в составе комплексной терапии Грандаксина у больных эрозивно-язвенным поражением гастродуоденальной зоны оказывает отчетливый терапевтический эффект: купируется болевой синдром, диспепсия.
- При применении Грандаксина наблюдается улучшение функционального состояния желудка, восстанавливаются протективные свойства желудочной слизи, ускоряется заживление эрозий и язв.
- Применение Грандаксина в составе комплексной терапии позволяет повысить эффективность лечения посредством нормализации вегетативной регуляции и улучшения психологического статуса у больных язвенной болезнью и эрозивными гастродуоденитами.